

### OSEBNA KARTICA ZDRAVIL

Pripravljeno po dogovoru s pacientom.

IME IN PRIIMEK:				Naslov:	DATUM PRIPRAVE:
ZDRAVILO učinkovina	ODMERJANJE			DODATNE INFORMACIJE O UPORABI	NAMEN UPORABE
	ZJUTRAJ	OPOLDNE	ZVEČER		
DIUVER tablete 10 mg (torasemid)	1 tableta			Neodvisno od hrane. Pogoltnite celo tableto.	odvajanje vode
Nebilet 5 mg tablete (nebivolol)	1/2 tablete			Neodvisno od hrane.	za srce in krvni tlak
Enap 10 mg tablete (enalapril)	1 tableta		1 tableta	Neodvisno od hrane.	za srce in krvni tlak
Aglurab 500 mg filmsko obložene tablete (metformin)	1 tableta		1 tableta	Skupaj s hrano (tik pred jedjo, med jedjo ali po jedi).	zdravljenje sladkorne bolezni
Xarelto 15 mg filmsko obložene tablete (rivaroksaban)			1 tableta	Skupaj s hrano (tik pred jedjo, med jedjo ali po jedi). Pozor ob uvedbi novega zdravila ali nakupu zdravila brez recepta in/ali prehranskega dopolnila.	preprečevanje strjevanja krvi
TRAVATAN 40 mikrogramov/ml kapljice za oko, raztopina (travoprost)			1 kapljica v vsako oko	S čistim prstom potegnite spodnjo veko navzdol, da med veko in očesom nastane žepček in kapnite v oko 1 kapljico. Po vkapanju zdravila spustite spodnjo veko, zaprite oko za najmanj 1 minuto in rahlo s prstom pritisnite v očesni kot ob nosu. Vso odvečno raztopino obrišite s kože okrog očesa.	za očesni tlak
LEKADOL 500 mg tablete (paracetamol)	po potrebi 3 x 2 tbl na dan			Neodvisno od hrane. Za hitrejši učinek tableto lahko vzamete 1 uro pred jedjo.	proti bolečinam
DRUGE INFORMACIJE:					
PRIPRAVIL:	LEKARNA:			TEL. ŠT. :	E-NASLOV: